

# COVID-19 & DMD/DMB

No hay ningún caso confirmado de DMD/DMB con COVID-19.



# COVID-19 & DMD/DMB

Las personas con Duchenne y Becker parecen no tener una mayor probabilidad de contraer el virus.



# COVID-19 & DMD/DMB

Usar ventilación (no invasiva) o el asistente de tos no afecta a las posibilidades de contraer el virus.



# COVID-19 & DMD/DMB

El lavado de manos con agua y jabón es lo más eficaz para todos (pacientes y cuidadores). Es importante la limpieza de superficies, pomos de puertas y pantallas táctiles.



# COVID-19 & DMD/DMB

Quédate en casa todo lo posible y anima a otros a hacer lo mismo.

#Home4Duchenne

#Home4Becker



# COVID-19 & DMD/DMB

Posponer cualquier visita no urgente y utiliza consultas telefónicas.



# COVID-19 & DMD/DMB

En los países donde los colegios están aún abiertos, se recomienda mantener a los niños con corticoides en casa, así como a los niños con problemas respiratorios.



# COVID-19 & DMD/DMB

La dosis de corticoides administrada en DMD no se considera un problema. No deje de tomar los corticoides, ya que pondrá al paciente en mayor riesgo.





# COVID-19 & DMD/DMB

No realizar ningún cambio en la medicación, a menos que sus médicos lo aconsejen. También recomendado para los inhibidores de la ECA.



# COVID-19 & DMD/DMB

Sería aconsejable pedir suministro de los medicamentos por un mes o dos en caso de escasez.



# COVID-19 & DMD/DMB

Generalmente, los pacientes con insuficiencia respiratoria deberían haber recibido la vacuna contra la tosferina e infecciones neumocócicas. Sin embargo, esto no brindará protección contra el COVID-19.



# COVID-19 & DMD/DMB

No está demostrado que alimentos o vitaminas específicas ayuden contra ningún virus. Los niños por regla general, deben comer frutas y verduras para obtener vitaminas y minerales.



# COVID-19 & DMD/DMB

Los pacientes con Duchenne y Becker tendrán un mayor riesgo de contraer el virus, ya que puede causar neumonía viral, y la neumonía es un riesgo de insuficiencia respiratoria en esta población.



# COVID-19 & DMD/DMB

Las enfermedades cardíacas es un factor de riesgo. Para los pacientes de Duchenne y Becker con insuficiencia cardíaca existe un mayor riesgo de verse gravemente afectado por una infección por COVID-19.



# COVID-19 & DMD/DMB

Sigamos las reglas del sentido común y la higiene, aplicables al público en general, y aún más importante para los cuidadores.

